

La comuna de Peñalolén se encuentra inserta en un tipo climático templado subhúmedo en transición al semiárido con precipitaciones de tipo mediterráneas. Estas se caracterizan por concentrar las precipitaciones en el período invernal en forma intensa y por poseer una estación seca estival prolongada de ocho meses. Las temperaturas son templadas (14,5°C de promedio anual), siendo enero el mes más cálido con 21,3°C, promedio; y julio el mes más frío con 7,9°C, promedio. Por otra parte, las precipitaciones son cercanas a los 400 mm anuales, concentrándose en un 83% entre los meses de abril a septiembre. Hacia la Precordillera el clima presenta una mayor oscilación térmica diaria y anual y un aumento considerable de las precipitaciones, las que pueden superar los 800 mm sobre los 1.000 metros de altitud. La isohípsa de los 1.700 metros marca el límite de las precipitaciones sólidas, las que se concentran entre mayo y agosto.

**Datos meteorológicos Estación Tobalaba (654 m.s.n.m.)**

Meses	Temperaturas (Grados Celsius)	Precipitaciones (En milímetros)	Días con lluvia	Intensidad de las precipitaciones	Indice de Aridez
Enero	21,3	2	0,5	4,00	7,83
Febrero	19,9	10	1,9	5,26	1,50
Marzo	17,8	7,7	1,1	7,00	1,81
Abril	14,6	15,5	1,2	12,92	0,79
Mayo	11,9	32,2	2,7	11,93	0,34
Junio	8,6	84,9	7,9	10,75	0,11
Julio	7,9	79,2	8,5	9,32	0,11
Agosto	9,4	44,9	7,1	6,32	0,22
Septiembre	11,1	31,3	4,1	7,63	0,34
Octubre	13,9	20,2	3,1	6,52	0,59
Noviembre	16,6	12,7	2,2	5,77	1,05
Diciembre	19,4	4,7	0,7	6,71	3,13
<b>Anual</b>	<b>14,4</b>	<b>345,3</b>	<b>41,0</b>	<b>8,42</b>	<b>0,85</b>

Fuente: